

# Bernache cravant - Branta bernicla - Brant Goose

Oiseaux.net

## Description de la famille

Les Anatidés sont des oiseaux de taille moyenne à grande, occupant tous les continents, excepté l'Antarctique. La famille est forte de quelque 174 espèces. Ils sont très liés à l'eau, majoritairement aux eaux douces. Leurs pattes courtes sont palmées, ce qui constitue une adaptation à la na... [lire la suite](#)

## Identification



adulte



adulte plum. internuptial

La bernache cravant est une petite oie à peine plus grande qu'un [Canard colvert](#). La poitrine, la tête et le cou sont noirs, avec une petite tache blanche de chaque côté en ce qui concerne ce dernier. Le dessous est gris-brun foncé, y compris le ventre qui peut avoir des reflets blanchâtres. Le [bec](#), les [pattes palmées](#) sont uniformément noirs. Le dessous de la queue est

blanc.

## Indications subspécifiques 3 sous-espèces

- *Branta bernicla bernicla* (nw and nc Russia)
- *Branta bernicla nigricans* (ne Siberia, Alaska, nw Canada)
- *Branta bernicla hrota* (ne Canada, Greenland, Spitzbergen)

## Noms étrangers

- [Brant Goose](#),
- Barnacla carinegra,
- ganso-de-faces-pretas,
- Ringelgans,
- [örvös lúd](#),
- Rotgans,
- Oca colombaccio,
- prutgås,
- Ringgås,
- bernikla tmavá,
- berneška tmavá,
- Knortegås,
- sepelhanhi,
- oca de collar,
- Margæs,
- bernikla obrožna,
- melngalvas zoss,
- grivasta gos,
- Чёрная казарка,
- コクガン,
- 黑雁,
- 黑雁,

## Voix chant et cris



adulte

- play
- 

Son cri habituel est un *rrrok rrok keukk keuk rrout* assez grave émis à terre comme au vol.

## Habitat



Elle fréquente la toundra à proximité des côtes ou des lacs en été. En hiver, elle privilégie les vasières proches des rivages dépourvus de reliefs. Répartition circumpolaire : Sibérie, Alaska, Canada, Groenland, Spitzberg. En augmentation constante dans ses quartiers d'hiver.

## Comportement traits de caractère



1ère année

Son comportement est plus aquatique que les autres oies, c'est une bonne nageuse. Elle a une activité aussi bien [nocturne](#) que [diurne](#). Sociable à l'extrême, son instinct [grégaire](#) la pousse à se regrouper en grandes troupes pendant l'hiver. Migratrice, elle occupe les côtes d'Europe Occidentale à partir du Danemark durant la période d'octobre à mars. Les populations du Groenland et de Sibérie migrent en direction des côtes de l'Atlantique et du Pacifique Nord en Amérique et en Asie.

## Vol



adulte

Le vol est rapide et la fréquence de ses battements est plus soutenue que les autres oies. Les bernaches cravant se déplacent en groupes en formations irrégulières, en longues rangées de front qui ondulent dans le ciel et rarement en V.

## Alimentation mode et régime



1ère année

Le régime est exclusivement végétarien : [algues](#), mousses, lichens en été ; zostères, salicornes, [algues](#) vertes, semis de céréales, herbacées en hiver.


## Reproduction nidification



1ère année

Elle niche solitairement ou en [colonie](#). Le nid est construit à même le sol et il est garni de [duvet](#). En juin, la femelle pond de 3 à 5 oeufs qui sont couvés pendant une période de 24 à 26 jours. Les oisillons désertent le nid dès qu'ils sont capables de se mouvoir de façon autonome.

## Distribution



## Menaces - protection

Statut de conservation IUCN

Eteint

Menacé

Préoccupation  
mineure

Éteint  
à l'état sauvage

Quasi  
menacé

Non  
évalué

EX EW CR EN VU NT LC NE