

# Chardonneret élégant - Carduelis carduelis - European Goldfinch

*Oiseaux.net*

## Description de la famille

Les Fringillidés (fringilles dans le langage courant) sont des passereaux de taille petite à moyenne (9 à 25 cm de longueur). Leur plumage est extrêmement variable et souvent haut en couleurs. Leur bec court et conique est adapté à un régime granivore, mais non exclusif. Ils occupent des mili... [lire la suite](#)

## Identification



adulte plum. nuptial



Poussin

Le Chardonneret élégant est un petit [passereau](#), d'une taille inférieure à celle d'un moineau et facile à reconnaître. En effet, l'adulte a une face rouge sang et une grande zone jaune-citron sur l'aile. Il y a un léger [dimorphisme](#) sexuel qui, si l'on peut dire, ne saute pas aux yeux. Le mâle a le rouge de la face qui déborde l'œil vers l'arrière tandis que chez la femelle, le rouge s'arrête au niveau de l'œil. Le reste de la tête est noir et blanc. L'œil sombre est inclus dans une zone locale noire. Le [bec](#), régulièrement conique, est rose pâle. Le dessus du corps (manteau, dos et scapulaires) est brun-chamois, excepté le croupion et les sus-caudales qui sont blancs, ce qui se voit bien chez l'oiseau en vol. Le brun du dessus gagne les côtés de la poitrine où il forme deux taches pectorales bien visibles, et les flancs, tandis que le reste du dessous est blanc. [Ailes](#) et queues sont noires avec des taches blanches sur les [rémiges](#) et les [rectrices](#). Le large bandeau jaune qui coupe l'aile en deux dans le sens de la longueur est très visible sur l'oiseau en vol. Les [pattes](#) sont roses ou rosâtres suivant la saison.

Le [juvénile](#) se reconnaît comme chardonneret au bandeau jaune de l'aile et se distingue très facilement de l'adulte à l'absence de rouge sur la face. De plus, la tête et le dessous de son corps sont beige blanchâtre et finement striés de brun.

Les oiseaux des [sous-espèces](#) orientales, caniceps ou subulata, ont la tête et le dessus du corps d'un brun-gris assez pâle.

## Indications subsppécifiques 10 sous-espèces

- Carduelis carduelis carduelis (s Scandinavia to c France and Italy and east to c European Russia)
- Carduelis carduelis britannica (British Isles, nw France and w Netherlands)
- Carduelis carduelis parva (sw Europe, nw Africa, Madeira, Balearic and Canary Is.)
- Carduelis carduelis tschusii (Corsica, Sardinia and Sicily)
- Carduelis carduelis balcanica (Balkans, Greece, Crete and nw Turkey)
- Carduelis carduelis niediecki (Middle East)
- Carduelis carduelis brevisrostris (e Turkey, s Caucasus and n Iran)
- Carduelis carduelis colchica (n Caucasus and Crimea. s Ukraine.)
- Carduelis carduelis volgensis (s Ukraine, s European Russia and nw Kazakhstan)
- Carduelis carduelis frigidus (sw and sc Siberia)

## Noms étrangers

- [European Goldfinch](#),
- Jilguero europeo,
- pintassilgo-europeu,
- Stieglitz,
- [tengelic](#),
- Putter,
- Cardellino,
- steglits,
- Stillits,
- stehlík obyčejný,
- stehlík obecný,
- Stillits,
- tikli,
- cadenera europea,
- Pistilfinka,
- szczygieł,
- dadzītis,
- lišček,
- Пшгел,
- ゴシキヒワ,

- 红额金翅雀,
- steglits,
- 金絲雀,

## Voix chant et cris



adulte plum. nuptial

- play
- 

Les cris sont typiques "tsi du dut", "ti pi dit", un "tchuii" montant, etc. Lors d'altercations, un cri chuinté assez discordant est émis en séries rapides.

Le [chant](#) est une phrase assez mélodieuse, qui a la tonalité des cris qu'elle inclut régulièrement, avec des notes roulées, des accélérations, le tout très caractéristique de l'espèce.

## Habitat



adulte

Le Chardonneret élégant est un oiseau assez commun des milieux boisés ouverts, qu'ils soient [feuillus](#) ou mixtes.

On le trouve ainsi au niveau des lisières, clairières et régénérations forestières, dans la steppe arborée, en forêt riveraine le long des cours d'eau et des plans d'eau, dans la garrigue ou le maquis méditerranéen, dans le [bocage](#), le long des routes, et en milieu anthropique dans les parcs, vergers et jardins arborés. Le territoire de nidification doit répondre à deux exigences. Il doit comporter des arbustes élevés ou des arbres pour le nid et une strate herbacée dense riche en graines diverses pour l'alimentation. A ce titre, les friches et autres endroits incultes jouent

un rôle essentiel.

## Comportement traits de caractère



adulte

Le Chardonneret élégant est une [espèce](#) volontiers [grégaire](#) en dehors de la période de reproduction. Ce gréganisme survient dès l'émancipation des jeunes de la première [nichée](#) et se poursuivra jusqu'à la saison de reproduction de l'année suivante. On peut alors observer des groupes de plusieurs dizaines d'oiseaux voletant ensemble, se nourrissant ensemble dans les hautes herbes ou sur les arbres porteurs de graines. Certains fréquentent les postes de nourrissage urbains où ils ne dédaignent pas les graines de tournesol. Les déplacements de type migratoire ou erratiques se font en petits groupes assez denses.

En revanche, dès le début du printemps, les groupes se disloquent et les couples déjà formés se choisissent un territoire de nidification. La territorialité est assez faible chez cette [espèce](#) et plusieurs couples peuvent s'installer à proximité les uns des autres. Il n'empêche que le chardonneret mâle est un oiseau plutôt agressif et facilement irritable. La [parade nuptiale](#) prend place en fin d'hiver au sein des groupes. Le mâle s'approche de la femelle convoitée, fait le dos rond tout en se tournant de droite à gauche, les [ailes](#) alternativement ouvertes, probablement afin d'en exhiber la couleur jaune, et en déployant la queue de manière à exposer les taches blanches des [rectrices](#).



immature

La [parade](#) comprend aussi des offrandes de nourriture, que la femelle accueille penchée en avant, [ailes](#) tremblantes, comme un jeune se faisant nourrir. On assiste aussi à des poursuites ponctuées de nombreux cris. Lorsque vient le temps de la nidification, la femelle se charge seule de la construction du nid, simplement accompagnée par un mâle attentif aux dangers potentiels. Et lorsqu'il y aura des jeunes au nid à nourrir, on verra le couple en quête de graines faire la navette ensemble entre les secteurs d'alimentation et le nid.

Les chardonnerets se nourrissent en voletant d'une plante ou d'un arbre à l'autre, souvent suspendus par les [pattes](#) tête en bas. Le [bec](#), conique mais pointu, est très adapté à extirper les petites graines du cœur des capitules, des cônes et autres fructifications denses.

Comme tous les [passereaux granivores](#), les chardonnerets ont un besoin physiologique d'eau et doivent s'abreuver. Ils en profitent pour se baigner. C'est souvent au bord de l'eau que l'on peut faire de belles observations de ces oiseaux.

Du fait de ses belles couleurs et de son [chant](#) agréable, le Chardonneret élégant a longtemps été convoité comme oiseau de cage. Il était pris au filet par des tendeurs et revendu aux éleveurs de canaris. Son croisement avec le canari produit en effet des [hybrides](#) esthétiques et chantant bien, très convoités autrefois. Ces pratiques ont en principe aujourd'hui disparu, au moins officiellement, en Europe où ont été adoptées des lois de protection.

## Vol



adulte plum. nuptial

Le vol du chardonneret est un vol rapide et ondulant, comme pour une majorité de fringilles. Le vol est typiquement ponctué de petits cris de cohésion.

## Alimentation mode et régime



adulte plum. nuptial

Le Chardonneret élégant est très majoritairement [granivore](#). Il se nourrit en toutes saisons de graines très diverses, que ce soit de plantes herbacées, particulièrement d'astéracées (chardons, asters, tussilage, etc.), mais également d'arbres (bouleaux, aulnes, pins, etc.). En hiver, il fréquente volontiers les postes de nourrissage, attiré par les graines qu'on y dépose, pas du tout par la graisse ou autres substances d'origine animale.

## Reproduction nidification



adulte plum. nuptial

La femelle construit le nid dans un arbuste ou un arbre, typiquement dans une fourche non loin de l'extrémité d'une branche, à une hauteur moyenne (2 à 10 m).



C'est un petit nid compact dont la construction est très soignée. Il est fait de mousse et d'herbes, le tout aggloméré le cas échéant avec de la soie d'araignée. La coupe est tapissée d'éléments doux tels que du [duvet](#) végétal des graines de saules ou de peupliers ou encore de laine de mouton, de [plumes](#). Des lichens sont incorporés à la paroi.

La femelle y dépose 4 à 5 œufs bleu pâle, tachetés de brun rougeâtre. L'incubation dure 12 à 14 jours et commence à la ponte du troisième œuf. La femelle assure seule l'incubation. Elle est nourrie par le mâle au nid pendant toute cette période.

Les deux parents nourrissent les jeunes essentiellement de graines humectées régurgitées du [jabot](#). Les jeunes quittent le nid au bout de 13 à 16 jours, et les parents les nourrissent encore pendant une semaine. À l'envol des jeunes, le rebord du nid est entièrement recouvert de leurs [fientes](#), ce qui veut dire qu'à la fin de l'élevage au nid, les adultes n'évacuent plus les [fientes](#) de leurs poussins.

Dans la majorité de l'aire, les chardonnerets peuvent élever deux [nichées](#) successives.

## Distribution



adulte plum. internuptial

L'aire de distribution s'étend de l'Atlantique (Irlande, Espagne, Maghreb, y compris Madère et Canaries) jusqu'au lac Baïkal à l'est du continent, et ce en une bande centrée sur les latitudes tempérées. Au nord, cette [aire](#) atteint le sud de la Fenno-Scandie et suit le sud de la Sibérie. Au sud, elle est fragmentée dans l'extrême nord-est de l'Afrique et ne devient continue qu'à partir de l'Asie mineure. Elle contourne la mer Caspienne par le sud, passe par le sud de l'Asie centrale puis rejoint la Sibérie par l'Altai. Une extension a lieu dans l'ouest de l'Himalaya. 12 [sous-espèces](#) se partagent cette [aire](#) assez vaste. L'Europe continentale est occupée par la ssp type "carduelis". L'espèce est réputée sédentaire dans la majorité de son [aire](#). Mais des déplacements orientés sont notables aux points de suivi de la [migration](#), ce qui suggère que les populations sont d'autant plus sujettes à déplacements saisonniers importants qu'elles sont nordiques.

## Menaces - protection



1ère année

### Statut de conservation IUCN

Eteint

Menacé

Préoccupation  
mineure

Éteint  
à l'état sauvage

Quasi  
menacé

Non  
évalué

EX EW CR EN VU NT LC NE

Le Chardonneret élégant est toujours actuellement une [espèce](#) commune, non menacé à l'échelle du continent. Cependant, il est certain que la détérioration et la banalisation des paysages campagnards, la disparition de nombreuses zones incultes au profit de l'urbanisation ou d'une agriculture productiviste, n'a pu qu'avoir un effet négatif sur les populations de chardonnerets dans nos pays développés.

Il fut un temps oiseau de cage et capturé dans ce but.

Actuellement, l'espèce est protégée et le piégeage illégal. Mais il est certain que le braconnage continue dans de nombreux pays méditerranéens, y compris européens, malgré les lois de protection. Il n'est qu'à penser à ce qui se passe à Chypre ou à Malte chaque année.