

Rougegorge familier - Erithacus rubecula - European Robin

Oiseaux.net

Description de la famille

Les Muscicapidés sont des passereaux de taille petite à moyenne (10 à 20 cm de longueur). Dans un premier temps, ils regroupaient principalement les gobemouches au sens large. Mais les recherches récentes ont montré qu'il fallait leur adjoindre certains taxons appartenant jusqu'alors aux Sylvii... [lire la suite](#)

Identification



2ème



1ère année

Le Rougegorge familier se présente comme un petit oiseau rondet, avec des [ailes](#) relativement courtes atteignant péniblement le milieu de la queue. L'adulte est aisément reconnaissable à la couleur orangée qui envahit tout le devant du corps, front, [lores](#), côtés de la tête, cou et poitrine. Cette grande zone orange est bordée d'un bandeau gris clair peu visible sur le haut du front et sur les côtés du cou et de la poitrine. Le reste du dessous est blanc sale lavé de roussâtre sur les flancs. Les parties supérieures sont d'un brun nuancé d'olive, assez sombre. Le croupion et les sus-caudales sont d'un brun un peu plus chaud. Les [rémiges](#) sont ourlées de chamois, ce qui éclaire un peu l'aile fermée sur laquelle se détachent les [couvertures primaires](#) plus sombres. L'œil est sombre. Le [bec](#) fin, court et droit est brun foncé, avec la base un peu plus claire. Les [pattes](#) sont rougeâtres ou brunâtres suivant la lumière, quelquefois rosées.

Le [juvénile](#) a une silhouette semblable à celle de l'adulte, mais un aspect très différent. La couleur orange est absente. L'ensemble du corps est brun, largement moucheté de chamois roussâtre comme c'est la règle chez les muscicapidés. Le futur [plastron](#) orange transparait néanmoins déjà car à ce niveau les [plumes](#) sont plus rousses qu'ailleurs. Néanmoins, il faudra attendre la [mue](#) post-juvénile pour voir apparaître les premières [plumes](#) orangées. Sur l'aile fermée se distingue nettement une barre rousse formée par les pointes des grandes [couvertures](#) ainsi colorées. Ce caractère persistera après la première [mue](#) et permettra l'année suivante de savoir qu'on a affaire à un oiseau de deuxième année. Autrement, les premières semaines, la commissure buccale jaune est bien visible.

Indications subsécifiques 9 sous-espèces

- Erithacus rubecula rubecula (continental Europe to Ural Mts., w Turkey, islands in e Atlantic and nw Morocco)
- Erithacus rubecula melophilus (British Isles)
- Erithacus rubecula superbus (Tenerife I.. c Canary Islands.)
- Erithacus rubecula marionae (Gran Canaria I.. c Canary Islands.)
- Erithacus rubecula witherbyi (n Algeria and n Tunisia)
- Erithacus rubecula valens (s Crimea. s Ukraine.)
- Erithacus rubecula caucasicus (e Turkey and the Caucasus)
- Erithacus rubecula hyrcanus (se Azerbaijan and n Iran)
- Erithacus rubecula tataricus (Ural Mts. and sw Siberia)

Noms étrangers

- [European Robin](#),
- Petirrojo europeo,
- pisco-de-peito-ruivo,
- Rotkehlchen,
- [vörösbecgy](#),
- Roodborst,
- Pettiroso,
- rödhake,
- Rødstrupe,
- červienka obyčajná,
- červenka obecná,
- Rødhals,
- punarinta,
- pit-roig,
- Glóbrystingur,
- rudzik,
- sarkanrīklīte,
- taščica,
- Зарянка,

- ヨーロッパコマドリ,
- 欧亚鸲,
- rödhake,
- 歐亞歌鸲,

Voix chant et cris



2ème

- play
-

Les émissions vocales du rougegorge sont typiques. Le cri le plus fréquent est un "tic" d'excitation métallique, volontiers répété en staccato et qui traduit une forme d'inquiétude. Chez l'oiseau très excité, il peut être émis à un rythme très rapide. C'est le cri utilisé par les adultes près du nid en cas de danger par exemple. Un autre cri classique consiste en un "tsiih" bref, aigu et pénétrant qui peut être considéré comme un cri de contact. Le [chant](#) est très caractéristique. C'est une suite de notes sifflées et roulées, de tonalité élevée, comme un babil doux et liquide, qui semble couler naturellement au long d'une phrase continue. Cette [espèce](#) a la particularité de connaître une reprise du [chant](#) à l'automne, [chant](#) qui servira aux mâles en hiver à défendre un territoire alimentaire. Ce [chant](#) est réputé plus doux que le [chant](#) printanier.

Habitat



adulte

Le Rougegorge familier est avant tout un oiseau de la forêt, qu'elle soit caducifoliée, sempervirente ou mixte.

C'est le milieu optimal qu'il fréquente sur les lieux de reproduction. Mais de là, il déborde sur

d'autres milieux arborés favorables tels que les forêts riveraines des cours d'eau, les parcs, les [haies](#) arborées, etc. À la mauvaise saison, il quitte largement la forêt, surtout les oiseaux nordiques qui sont [migrateurs](#), pour gagner des milieux plus anthropisés comme les jardins à la campagne, mais aussi en ville, les marges des zones agricoles pourvues de ligneux, garrigue et maquis en biôme méditerranéen, etc. On peut presque dire qu'il peut être partout où il y a des ligneux dans l'aire d'hivernage.

Comportement traits de caractère



juvénile

Le Rougegorge familier est un oiseau au comportement solitaire et territorial. Posé, il adopte une attitude dressée, relevant parfois la queue et baissant les [ailes](#) tout en faisant des courbettes sur ses jambes assez robustes. Il use de son [plastron](#) "rouge" comme avertisseur et n'hésite pas à l'exhiber en toutes occasions quand il s'agit pour lui de faire valoir ses droits, réels ou usurpés. Les mâles territoriaux s'affrontent ainsi, poitrine haute, tout en vocalisant abondamment afin de défendre les limites de leur domaine. Même à la mauvaise saison, les rougegorges plastronnent pour défendre un territoire alimentaire et poursuivent vivement les importuns pour les refouler hors des limites invisibles qu'ils se sont fixées.

Au moment de la reproduction, les mâles chantent perchés en évidence sur une branche pour être bien vus de leurs congénères. Dans un sous-bois, il n'est néanmoins pas facile de les repérer, mais en milieu semi-ouvert d'altitude par exemple, ils peuvent se percher au sommet d'un petit conifère dégagé et deviennent alors bien visibles.

Autrement c'est un oiseau assez peu farouche, et même parfois confiant. Il est assez classique par exemple que le rougegorge s'approche d'une personne en train de jardiner ou de faire de l'affouage en forêt, prompt à fondre sur le ver ou l'insecte dérangé.



adulte

Il se montre parfois si confiant qu'il peut se poser sur la bêche ou la cognée du travailleur et même sur sa botte quand il se repose. On ne peut s'empêcher de penser alors à un oiseau provenant d'une forêt profonde du nord qui n'aurait jamais été confronté à l'homme et au danger qu'il peut représenter pour lui. En hiver toujours, on le voit très souvent près des habitations. Il lui arrive de pénétrer dans les granges, hangars et autres endroits confinés. Le rougegorge se nourrit au sol. Il repère ses proies depuis un perchoir peu élevé et les capture à l'issue d'un petit vol d'approche. Plus rarement, il se déplace au sol en sautillant et en scrutant la surface terrestre.

Le rougegorge est un oiseau peu sociable et pas du tout [grégaire](#). On ne le voit jamais en groupe, même dans les endroits à forte densité spécifique. Il migre en solitaire et de nuit et les jours de grande [migration](#), on peut voir au matin de nombreux rougegorges fraîchement arrivés à un endroit donné, mais ne formant jamais de groupe organisé. Au contraire, ils manifestent entre eux une certaine agressivité. Les querelles territoriales peuvent aller jusqu'à de sérieuses prises de [bec](#) qui durent, mais en principe sans issue fatale.

Vol



adulte

Le rougegorge vole facilement, mais on a rarement l'occasion de le vérifier car c'est un [migrateur nocturne](#) dont les déplacements au long cours échappent à l'observation. De lui, on connaît surtout le vol bas et direct qu'il utilise pour fuir quand on le dérange, pour passer d'un arbre ou d'un buisson à l'autre ou traverser une route à découvert. L'essentiel de ses déplacements dans le sous-bois sombre restent invisibles.

Alimentationmode et régime



adulte

Le Rougegorge familier est essentiellement [insectivore](#), tout particulièrement à la belle saison, mais aussi au sud en hiver.



juvénile

Il se nourrit d'insectes et de leurs [larves](#) (coléoptères et diptères particulièrement) et de divers petits invertébrés (arachnides, myriapodes,...). À la mauvaise saison, il se tourne volontiers vers les petits fruits charnus tels que les baies de divers arbustes fructifères comme les ifs, les genévriers, les cotonéasters et autres sorbiers. Il peut également consommer de petites graines, voire des restes alimentaires en milieu habité. Il est facile de l'attirer sur son balcon avec de simples miettes de pain. À l'occasion, il saura profiter de la boule de graisse suspendue en hauteur au point de nourrissage comme on nous l'a signalé. Il peut aussi récupérer les bribes tombées au sol.

Reproduction nidification



adulte

Le Rougegorge familier est un semi-cavernicole pour la nidification. Le nid est toujours très bien caché dans une anfractuosit  de rocher ou d'arbre, contre un talus couvert de lierre, dans une souche pourrie, sous une touffe herbac e et tr s difficile   d couvrir.



Il ne s'impose jamais   la vue. C'est la femelle qui le construit, au sol ou alors   tr s faible hauteur, dans la cache choisie. C'est une structure faite, de brindilles, d'herbes et feuilles s ches, de mousse, et la coupe int rieure est tapiss e de crin v g tal et/ou de poils animaux, mais pas de [plumes](#).

La femelle y d pose 5   7  ufs blanc bleut  avec des taches rouges. L'incubation dure de 11   14 jours, assur e par la femelle qui est alors nourrie par le m le. Les poussins sont [nidicoles](#), nourris et prot g s par les parents. Ils quittent le nid   l' ge de 12   15 jours et deviennent ind pendants en moyenne trois semaines plus tard.

Dans le sud de l'aire, deux [nich es](#) successives semblent la r gle, mais dans le nord, l'esp ce ne doit pouvoir  lever qu'une [nich e](#).

Distribution





adulte plum. internuptial

Le Rougegorge familier est une [espèce](#) de l'ouest du continent eurasiatique, majoritairement européenne. Il déborde sur certaines îles de l'Atlantique occupées par des [sous-espèces](#) différentes et sur le Maghreb à l'ouest, et sur la Sibérie occidentale à l'est. La population du nord du continent est migratrice et gagne des contrées plus méridionales en hiver, typiquement le pourtour méditerranéen et les abords du golfe Persique.

Menaces - protection



2ème

Statut de conservation IUCN

Eteint

Menacé

Préoccupation
mineure

Éteint
à l'état sauvage

Quasi
menacé

Non
évalué

EX EW CR EN VU NT LC NE

Le Rougegorge familier est largement répandu dans la majeure partie de son [aire](#) et non menacé. Et pourtant, il est bien connu que l'espèce fait l'objet au sud de la Méditerranée de forts

prélèvements au filet ou par d'autres moyens, comme beaucoup d'autres [espèces](#) d'oiseaux [migrateurs](#), par les populations locales dans un but culinaire.