

Mésange charbonnière - Parus major - Great Tit

Oiseaux.net

Description de la famille

Les paridés sont des passereaux corpulents de taille petite à moyenne. La couleur de leur plumage résulte essentiellement de la combinaison de jaune, rouge, bleu, noir et blanc. Les parties colorées sont d'habitude bien tranchées et dépourvues de stries ou taches. Leur bec est droit, assez cou... [lire la suite](#)

Identification



♂ adulte plum. nuptial



♀ adulte plum. nuptial

La Mésange charbonnière est une grande mésange, la plus grande de celles auxquelles nous sommes confrontés dans l'ouest du continent. Elle est remarquable par sa tête noire à larges

[joues](#) blanches. L'œil très sombre est noyé dans ce noir. Le dessus du corps, manteau et dos, est verdâtre avec une zone plus claire sur la nuque. Les [ailes](#) et la queue sombres sont d'un gris nettement nuancé de bleu. Une barre [alaire](#) blanche se distingue sur les grandes [couvertures alaires](#). Les parties inférieures sont jaunes mais s'éclaircissent vers la queue. L'arrière des flancs est gris. Le bas-ventre et les sous-caudales sont blancs avec un trait noir médian sur ces dernières. Un bandeau noir médio-ventral court de la gorge au ventre, large et d'un noir profond chez le mâle adulte, plus restreint et plus irrégulier chez la femelle. Ce [dimorphisme](#) sexuel n'est évident que chez les adultes. En vue de dessous, la queue paraît bordée de blanc. Ce blanc sur les [rectrices](#) externes est bien visible en vol lorsque la queue est ouverte. Le [bec](#) est noir et les [pattes](#) sont d'un gris bleuté.

Le [juvénile](#) a des couleurs plus ternes que celles de l'adulte. Le noir de la tête est mat. Les [joues](#) sont lavées de jaune. Le bandeau noir ventral est à peine indiqué. Il faut attendre la [mue](#) post-juvénile pour que le plumage soit plus conforme à ce qu'on attend de l'espèce.

Il existe, ou plutôt existait car la situation taxonomique a changé, de très nombreuses [sous-espèces](#) (36) de Mésange charbonnière, sensu lato, qui diffèrent surtout par la coloration. La [sous-espèce](#) major qui occupe l'Europe continentale, très colorée comme on l'a vu plus haut, se situe à l'extrémité occidentale d'un [cline](#) qui en Extrême-Orient donne des [sous-espèces](#) comme cinereus ou nipalensis qui ont perdu le jaune du plumage et sont entièrement en noir, blanc et nuances de gris. Ces dernières ont été récemment élevées au rang d'espèces, ce qui fait que le nombre actuel de [sous-espèces](#) de Parus major stricto sensu est de 16.

Indications subsppécifiques 16 sous-espèces

- Parus major major (mainland Europe to w and sc Siberia, the Caucasus and Asia Minor)
- Parus major newtoni (British Isles)
- Parus major kapustini (se Kazakhstan and nw China to Mongolia and e Siberia)
- Parus major corsus (Portugal, s Spain and Corsica)
- Parus major mallorcae (Balearic Is.)
- Parus major excelsus (nw Africa)
- Parus major ecki (Sardinia)
- Parus major aphrodite (s Italy, s Greece, the Aegean Is. and Cyprus)
- Parus major niethammeri (Crete)
- Parus major terraesanctae (Syria to ne Egypt)
- Parus major karelini (se Azerbaijan and nw Iran)
- Parus major blanfordi (n Iraq, nc and sw Iran)
- Parus major bokharensis (Turkmenistan and n Afghanistan to sc Kazakhstan and Uzbekistan)
- Parus major turkestanicus (se Kazakhstan to sw Mongolia)
- Parus major ferghanensis (Tajikistan and Kyrgyzstan to w China)
- Parus major intermedius (ne Iran and sw Turkmenistan)

Noms étrangers

- [Great Tit](#),
- Carbonero común,
- chapim-real,
- Kohlmeise,
- [széncinege](#),
- Koolmees,
- Cinciallegre,
- talgoxe,
- Kjöttmeis,
- sýkorka veļká,
- sýkora koňadra,

- Musvit,
- talitiainen,
- mallerenga carbonera,
- Flotmeisa,
- bogatka (zwyczajna),
- lielā zīlīte,
- velika sinica,
- Большая синица,
- ヨーロッパシジュウカラ,
- 大山雀,
- talgoxe,
- 大山雀,

Voix chant et cris



♂ adulte plum. internuptial

- play
-

La Mésange charbonnière est très vocale en toutes saisons. Elle possède un répertoire assez varié (40 notes distinctes connues) avec quelques constantes. Le [chant](#) est une phrase simple pouvant être rendue par des "tsi tu" ou encore "hu dit" ou "ti du", longuement répétés, parfois trisyllabique "tsi tsi tu". Les cris de contact sont de petits "tit" aigus. Un "tsi de de" est proche d'un des cris de la [Mésange nonnette](#). Un des cris habituels, un "fint" est similaire au cri habituel du pinson, à s'y tromper. Un "psi psi hin hin hin hin" est fréquent. Également un "chchchchch". D'autres sont intraduisibles. Les oiseaux de l'est venant en France se reconnaîtraient à leur cri dédoublé "huit huit".

Habitat



La Mésange charbonnière est un oiseau forestier fréquentant de nombreux facies différents y compris conifériens, mais avec une préférence pour les forêts caducifoliées.

En Europe, sa préférence va à la chênaie. Sa densité peut y dépasser les 300 couples au km². On la trouve aussi dans la forêt de conifères d'altitude où elle est dominée en nombre par la [Mésange noire](#). La plasticité de son écologie lui permet d'occuper à peu près toutes sortes de milieux arborés, naturels ou artificiels, parcs et jardins y compris en ville, vergers, [bocage](#), ripisylve, etc.

Comportement traits de caractère



juvénile

La Mésange charbonnière est une [espèce](#) commune et qui donc côtoie souvent l'Homme. En période de reproduction, elle occupe le milieu forestier en formant des couples territoriaux qui défendent leur domaine. Elle montre alors une forte agressivité envers ses congénères. Mais en dehors de cette période, elle devient [grégaire](#) et forme avec ses consœurs et d'autres [espèces](#) de mésanges, et même d'autres [passereaux](#) comme les sittelles et les grimpereaux, des troupes lâches qui vagabondent à la recherche de nourriture dans tous les milieux pourvus d'arbres. C'est ce qu'on appelle vulgairement des "rondes de mésanges". Cela leur procure un avantage en terme de protection contre les prédateurs, mais aussi dans la découverte de sources de nourriture.

C'est un oiseau cavernicole pour la nidification. Elle construit son nid dans toutes sortes de cavités et anfractuosités, naturelles ou artificielles. Il est facile de l'attirer par exemple dans un nichoir artificiel. Il lui arrive d'occuper des endroits insolites comme les boîtes aux lettres. Très dangereux pour elle en revanche, les poteaux creux dans lesquels elle peut s'aventurer à la recherche d'un site de nid, mais dont elle ne peut plus ressortir à cause de leur étroitesse et profondeur.



adulte plum. nuptial

Il est malheureusement classique de trouver des poteaux emplis de cadavres d'oiseaux, mésanges et autres, qui y ont été piégés. En France, les services en charge des poteaux électriques ou téléphoniques ont normalement la consigne d'obturer leurs poteaux avec un dispositif adapté conçu pour ça.

La Mésange charbonnière recherche sa nourriture dans la végétation ligneuse, mais aussi au sol. Elle a à sa disposition deux outils performants, un [bec](#) pointu très solide qui lui permet en particulier de percer ou casser les graines à paroi épaisse, et des [pattes](#) robustes et griffues dont elle se sert pour caler sa proie ou sa graine sur un support avant de l'attaquer du [bec](#). Ses [pattes](#) particulières sont, comme pour toutes les mésanges, une adaptation à la vie [arboricole](#). Elles lui permettent de saisir facilement rameaux et branches, de s'agripper latéralement aux troncs, de se suspendre tête en bas pour explorer les parties inaccessibles aux autres oiseaux comme le dessous des branches, les bourgeons terminaux, les cônes des conifères, etc. En hiver, c'est une [espèce](#) classique des postes de nourrissage qui s'intéresse aussi bien à une nourriture d'origine animale comme la graisse qu'aux graines grasses comme celles du tournesol. La graisse est exploitée sur place tandis que les graines sont emportées au [bec](#) pour être cassées sur une branche voisine.

L'espèce est réputée sédentaire dans toute son [aire](#). Tout au plus connaît-elle un erratisme inter-nuptial guidé par la recherche de nourriture ou lors de petits déplacements altitudinaux.

Vol



♂ adulte

Le vol de la charbonnière est direct et onduleux. Ses [ailes](#) relativement courtes sont signes de sa sédentarité. Elles lui permettent d'être très agile dans le milieu forestier qu'elle fréquente à longueur d'année. Ses [ailes](#) lui servent aussi lors de la [parade nuptiale](#) au moment de la

formation des couples.

Alimentation mode et régime



♀ adulte

La Mésange charbonnière a un régime alimentaire diversifié, qui peut se décliner en deux parties.



adulte

la belle saison, ce régime est basé sur une alimentation animale et est alors largement [insectivore](#). On sait que la reproduction des mésanges est calquée sur la disponibilité des chenilles de lépidoptères avec lesquelles les jeunes sont majoritairement nourris. Ce régime peut être complété par d'autres invertébrés tels que [insectes](#) divers et araignées si nécessaire. Il y a en effet de bonnes et de mauvaises années à chenilles.

En période [internuptiale](#), elle se tourne vers les nouvelles sources de nourriture qui se présentent, à savoir les fruits et les graines. Elle est assez indésirable dans les vergers où elle peut attaquer les fruits sans les consommer entièrement, mais ses dégâts sont loin d'atteindre l'ampleur de ceux causés par les étourneaux par exemple. Ce sont les graines essentiellement qui lui permettront de subsister l'hiver. C'est la raison pour laquelle elle vient facilement à la mangeoire récupérer les graines de tournesol que son [bec](#) puissant lui permet de casser.

Reproduction nidification



♂ adulte plum. nuptial

La nidification est printanière, essentiellement d'avril à juin dans toute la bande tempérée du domaine [paléarctique](#). Le nid est construit dans une cavité [arboricole](#) ou rupestre, toujours à l'abri des regards. Il est fait de matériaux divers, feuilles, herbes et mousse, mais la mousse domine toujours dans la super-structure tandis que les poils et les [plumes](#) garnissent la coupe où seront déposés les œufs. La quantité de mousse apportée varie suivant l'espace disponible. Cela varie du simple au décuple et plus. Dans une boîte aux lettres par exemple, les oiseaux amasseront beaucoup de mousse pour occuper l'espace, la coupe étant reléguée dans le coin le plus obscur, à condition que le facteur ne passe pas tous les jours.



♀ adulte plum. nuptial

L'entrée doit mesurer au moins 25 mm de largeur pour que l'espèce puisse s'y glisser. La construction du nid échoit à la femelle, ravitaillée par le mâle qui lui s'occupe surtout de la défense du territoire. Les mésanges adoptant une stratégie de reproduction basée sur une grande prolificité, la taille de la ponte est toujours élevée. Une femelle peut pondre jusqu'à 18 œufs par [cuvée](#), le plus souvent de 5 à 12. L'incubation dure 13 ou 14 jours. Le séjour au nid est d'environ 3 semaines et il en faudra encore trois autres avant que les jeunes ne deviennent indépendants. Les secondes pontes sont habituelles en conditions normales, ce qui fait que chaque année, un grand nombre de jeunes arrivent à l'envol. Les jeunes sont nourris essentiellement de proies animales énergétiques comme les chenilles. Les mésanges ne stockant pas de nourriture dans leur [jabot](#), la fréquence de nourrissage est très

élevée. On a calculé qu'un couple pouvait apporter à leurs poussins jusqu'à 900 becquées par jour.

Bien qu'ils soient en principe bien protégés dans leur cavité, les œufs ou les jeunes ne sont pas à l'abri de la prédation. Le [Pic épeiche](#) par exemple est connu pour s'attaquer aux [couvées](#) ou aux [nichées](#) de mésanges, en élargissant l'entrée à coups de [bec](#) si nécessaire.

Distribution



adulte

La Mésange charbonnière de l'ancienne acception a une vaste répartition sur l'ensemble du continent eurasiatique de l'Europe de l'Ouest au Japon, à des latitudes moyennes, débordant légèrement sur le nord de l'Afrique. On la trouve aussi en conditions tropicales en Inde, Chine et Indochine. Trois taxons se trouvent même en Indonésie au niveau de l'Équateur.

La Mésange charbonnière au sens strict cette fois, *Parus major*, occupe sur le continent une bande septentrionale qui va de l'Atlantique à la Sibérie orientale incluant toute l'Europe, le Maghreb et l'Asie mineure, atteint au sud le nord de l'Iran et suit la Sibérie en passant par l'Altai et la Mongolie.

Menaces - protection



♂ adulte plum. nuptial

Statut de conservation IUCN

Eteint

Menacé

Préoccupation
mineure

Éteint
à l'état sauvage

Quasi
menacé

Non
évalué

EX EW CR EN VU NT LC NE

La Mésange charbonnière n'est pas menacée pour l'instant. Elle est commune et largement répandue dans son habitat. En France, elle est protégée par la loi comme une grande majorité de [passereaux](#).