

Mouette mélanocéphale - Ichthyaetus melanocephalus - Mediterranean Gull

Oiseaux.net

Identification



adulte plum. nuptial



adulte plum. internuptial

La Mouette mélanocéphale est un laridé de taille moyenne. Son [envergure](#) est d'un mètre environ. Elle est un peu plus grande que la [Mouette rieuse](#). L'adulte ne pose pas de problème d'identification. Elle est la seule mouette vraie à avoir les [rémiges](#) toutes blanches. De plus, en plumage nuptial, elle est la plus largement encapuchonnée de noir et ses yeux, déjà cerclés de rouge, sont rendus bien visibles par deux croissants blancs, l'un au-dessus, l'autre dessous. Enfin le [bec](#) est haut, plus haut que celui de la rieuse par exemple, et rouge-vermillon. Il possède une barre sombre [subterminale](#) et souvent une pointe plus jaune.

Le dessus du corps et les [couvertures alaires](#) sont d'un gris très pâle et toutes les parties inférieures sont blanches. La queue est blanche. Les [pattes](#) sont rouges comme le [bec](#). En plumage internuptial, il ne reste du capuchon noir qu'une tache couvrant l'œil et l'oreille et la barre du [bec](#) est plus nette.

Le plumage nuptial n'est acquis qu'en 3ème année calendaire, lorsque le jeune oiseau a un peu plus de 2 ans. Au cours du 2ème hiver et en début de 3ème année, les [rémiges](#) ont encore des taches noires, le [bec](#) et les [pattes](#) sont plus jaunes que rouges.

Le [juvénile](#) a bien sûr la même [morphologie](#) mais est très différent d'aspect. Les parties supérieures ont un aspect écaillé venant du fait que les [tectrices](#) brunes du corps et des [couvertures alaires](#) ont un liseré clair. Les parties inférieures sont d'un blanc teinté de brun beige, particulièrement aux côtés de la poitrine. La tête est teintée de même et présente une tache plus sombre devant l'œil. Les croissants blancs des yeux sont déjà présents. Le [bec](#) est noir et les [pattes](#) d'un gris rougeâtre.

C'est sur le jeune en vol que l'on peut analyser les [ailes](#) et la queue. La main est d'un brun très sombre. Le [bras](#) est tricolore. Les petites et moyennes [couvertures](#) sont brunes. Les grandes [couvertures](#) claires forment une bande pâle et les [rémiges secondaires](#) terminées de brun-noir forment une bande postérieure sombre. La queue blanche possède elle aussi une barre noire terminale. Ce patron de plumage peut prêter à confusion avec celui du jeune [Goéland cendré](#) par exemple. Attention.

Indications subsppécifiques espèce monotypique

Noms étrangers

- [Mediterranean Gull](#),
- Gaviota cabecinegra,
- gaivota-de-cabeça-preta,
- Schwarzkopfmöwe,
- [szerecsensirály](#),
- Zwartkopmeeuw,
- Gabbiano corallino,
- svarthuvad mås,
- Svartehavsmåke,
- čajka čiernohlavá,
- racek černohlavý,
- Sorthovedet Måge,
- mustanmerenlokki,
- gavina capnegra mediterrània,
- Lónamáfur,
- mewa czarnogłowa,
- melngalvas kaija,
- črnoglavi galeb,
- Черноголовая чайка,
- ニシズグロカモメ,
- 地中海鸥,
- svarthuvad mås,
- 黑頭鷗,

Voix chant et cris



1ère année

- play
-

Le cri habituel peut se traduire par "heiiin" de tonalité plus goéland que mouette pourrait-on dire et répété à l'envi "heiiin heiiin heiiin...", ce qui, dans une [colonie](#) de nidification, donne lieu à un vrai concert.

Habitat



adulte plum. transition

L'habitat est varié et varie suivant les localités et les saisons. On peut l'observer ainsi sur les côtes (marais côtiers, marais salants, estuaires, ports,...) et sur les eaux de l'intérieur (plans et cours d'eau, réservoirs et bassins, y compris industriels,...) ainsi que sur les terres cultivées environnantes. C'est une [espèce](#) adaptable qui sait s'adapter à de nouvelles conditions environnementales.

Comportement traits de caractère



adulte plum. nuptial

La Mouette mélanocéphale est une [espèce grégaire](#) comme la majorité des laridés. Elle se reproduit en [colonies](#), y compris pluri-spécifiques, et les individus restent groupés le reste de l'année dans les endroits favorables.

Vol



adulte plum. nuptial

Le vol est aisé, comme il se doit pour un [migrateur](#). En effet, la Mouette mélanocéphale est un [migrateur](#) partiel et gagne après la reproduction les eaux côtières du sud de l'Europe et du nord de l'Afrique où elle passera l'hiver.

Alimentation mode et régime



adulte

La Mouette mélanocéphale se nourrit d'une grande variété d'invertébrés, aussi bien terrestres qu'aquatiques suivant les phases de sa vie, arthropodes, annélides et [mollusques](#) particulièrement, mais également de petits poissons bien sûr en eau peu profonde. Elle peut aussi s'attaquer occasionnellement à des poussins d'oiseaux ou à des petits mammifères.

Reproduction nidification



adulte plum. nuptial

Comme dit plus haut, la Mouette mélanocéphale se reproduit généralement de façon coloniale et les [colonies](#) peuvent être très populeuses avec des 100es de couples.



adulte plum. nuptial

On observe également des couples isolés au sein de [colonies](#) de Mouettes rieuses, et même des couples mixtes rieuse x mélanocéphale.

Le milieu peut être naturel ou artificiel comme un bassin de décantation industriel dès lors qu'il y a possibilité de nidifier en sécurité.

L'arrivée des nicheurs a lieu en avril et la nidification suit en mai. Le nid est construit non loin de l'eau, sur un îlot par exemple. C'est une simple coupe faite de végétaux amassés sur le sol ou la végétation basse. La densité en nids peut atteindre 5 au m².

La ponte est de 2 ou 3 œufs qui seront incubés un peu moins de 4 semaines et les jeunes seront volants à 5 semaines environ.

La productivité est faible chez cette [espèce](#).

Distribution





2ème

La Mouette mélanocéphale se reproduit aux latitudes moyennes de l'Atlantique à la Mer Caspienne dans la mesure des espaces favorables, avec un point fort au nord de la Mer Noire. L'aire d'hivernage est plus au sud, autour des différents espaces maritimes, Mers Noire, de Marmara, Egée, Méditerranée et sur le littoral atlantique, du Benelux au Sahara occidental.

Menaces - protection



3ème

Statut de conservation IUCN

Eteint

Menacé

Préoccupation
mineure

Éteint
à l'état sauvage

Quasi
menacé

Non
évalué

EX EW CR EN VU NT LC NE

La Mouette mélanocéphale n'est pas menacée actuellement. Elle a été assez longtemps en progression numérique et territoriale à l'est vers la Caspienne comme à l'ouest dans la plupart des pays européens jusqu'à la façade atlantique, l'Espagne étant le dernier à avoir été touché par la progression qui s'est ensuite atténuée à cause des problèmes rencontrés du fait de l'Homme,

principalement les atteintes aux habitats. Mais l'espèce est très sensible aux dérangements liés au développement des activités humaines comme le tourisme et les activités de loisirs. La prédation dans les [colonies](#) sur poussins et œufs par les grands goélands peut aussi être un vrai problème, d'autant plus que la productivité de l'espèce est faible.